

หากมีปัญหาหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่

1. กรมควบคุมโรค สายด่วน 1422
2. สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร.0-2590-3177-78
3. กรมปศุสัตว์ โทร.0-2653-4444 ต่อ 4161-2
4. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร.0-2252-0161-7
5. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด
6. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/ จังหวัด
7. โรงพยาบาลทุกแห่ง

ด้วยความปรารถนาดีจาก

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนทอง อำเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี 18190
โทร.036-340438



ทำอย่างไรเมื่อ... ถูกสุนัขกัด ข่วน

- ล้างแผล**
ด้วยน้ำสะอาด และสบู่เบาๆหลายๆครั้ง
- ใส่ยา**
เช็ดแผลให้แห้งแล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ
- ขังสัตว์**
เพื่อสังเกตอาการ 10 - 15 วัน
- หามอม**
เพื่อรักษาและฉีดวัคซีนตามกำหนด

ทำอย่างไรเมื่อ ถูกสุนัขกัด ข่วน

ล้างแผล ด้วยน้ำสะอาด และสบู่เบาๆหลายๆครั้ง

ใส่ยา เช็ดแผลให้แห้งแล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ

ขังสัตว์ เพื่อสังเกตอาการ 10 - -15 วัน

หามอม เพื่อรักษาและฉีดวัคซีนตามกำหนด



โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ภัยร้ายใกล้ตัว



โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่

สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

คนติดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ชนิดใดบ้าง

โรคพิษสุนัขบ้าพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น แมว ค้างคาว วัว ลิง ชะนี กระรอก กระต่าย รวมถึงหนู เป็นต้น แต่พบว่าสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่นำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนได้บ่อยที่สุด โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อโดยการสัมผัสกับน้ำลายจากการ

ถูกกัด ข่วนหรือเลียบริเวณที่มีบาดแผลรอยถลอก หรือรอยขีดข่วนบาดแผลหรือถูกเลียบริเวณเยื่อตา หรือปาก เป็นต้น นอกจากนี้ การฆ่าเชื้อแผลจากสัตว์ หรือรับประทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็สามารถติดต่อได้

อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในคนเป็นอย่างไร

หลังได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าผู้ป่วยจะแสดงอาการป่วยโดยเฉลี่ยประมาณ 3 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน ในบางรายอาจใช้เวลานานหลายปีกว่าจะมีอาการได้ ทั้งนี้ขึ้นกับตำแหน่งที่ถูกกัด ขนาด จำนวนและความลึกของบาดแผลรวมถึงภูมิคุ้มกันของคนที่ถูกสัตว์ กัดอาการของโรคพิษสุนัขบ้าแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

1.ระยะเริ่มต้น ผู้ป่วยจะมีอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยตามตัว หนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียน ภาวะง่วงนอนไม่หลับ ในบางรายอาจมีอาการเจ็บ เสียวแปล๊บ คล้ายเข็มทิ่ม หรือคันอย่างมากบริเวณที่ถูกกัด ซึ่งเป็นลักษณะที่จำเพาะของโรคระยะนี้มีเวลาประมาณ 2-10 วัน

2.ระยะที่มีอาการทางสมอง ผู้ป่วยจะมีอาการสับสน วุ่นวาย กระสับกระส่าย อยู่ไม่นิ่ง กลืนลำบาก รวมถึงกลืนน้ำ อาการจะมากขึ้นหากมีเสียงดัง หรือถูกสัมผัส

เนื้อตัว จากนั้นผู้ป่วยอาจมีอาการชักและเป็นอัมพาต ระยะนี้มีอาการประมาณ 2-7 วัน

3.ระยะท้าย ผู้ป่วยอาจมีภาวะหายใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น โคม่า และเสียชีวิตในเวลาอันสั้น

โรคพิษสุนัขบ้า
น่ากลัวกว่าที่คิด

โรคพิษสุนัขบ้า : เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส โดยมีพาหะนำโรคเป็นสัตว์ลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว กระรอก ชะนี เป็นต้น

การติดต่อ : เกิดจากน้ำลายของสัตว์เลี้ยงที่อาจะกัด ข่วน หรือเลียตามบาดแผล

สังเกตอาการ : เบื่ออาหาร ไข้ตัวร้อน มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคัน บริเวณที่ถูกกัด หรือเลียบาดแผล กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม กลัวน้ำ มีอาการชักเกร็ง อัมพาต และเสียชีวิตในเวลาอันสั้น

การรักษา : วัคซีนพิษสุนัขบ้าสามารถรักษาได้โดยฉีดเพียง 4-5 เข็ม ฉีดได้ทั้งเด็กและสัตว์มีครรภ์

สัตว์เลี้ยงจากสวนสาธารณะได้ เป็นโรคพิษสุนัขบ้า โดยสัตว์มีครรภ์ !!!

หยุดเสี่ยงด้วยคาถา 5ย. ป้องกันพิษสุนัขบ้า

- อย่าแหย** ให้สุนัขโมโห
- อย่าเหยียบ** สุนัขให้ตกใจ
- อย่าแยก** สัตว์ที่กัดกันด้วยมือเปล่า
- อย่าหยิบ** แย่งจานอาหาร
- อย่ายุ่ง** สุนัขที่ไม่ได้เลี้ยง

คาถา 5 ย กันสุนัขกัด

- ย 1 อย่าแหย สุนัขให้โมโห
- ย 2 อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขตกใจ
- ย 3 อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดด้วยมือเปล่า
- ย 4 อย่าหยิบ จานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะสุนัขกำลังกินอาหาร
- ย 5 อย่ายุ่ง หรือเข้าไปใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ